



Wspieramy naturę od 1991 roku



**Polskie[®]
Składy
Rolne**



*Inwestuj
w dobry plan!*

Wiosna 2022

Środki Ochrony Roślin



U progu kolejnego sezonu sprzedaży środków ochrony roślin stoimy przed nowymi wyzwaniami związanymi z doborem substancji aktywnych dla pełnej ochrony upraw rolno-ogrodniczych.

Komisja Europejska corocznie wycofuje kolejne substancje aktywne uszczuplając paletę produktów do ochrony insektycydowej, fungicydowej oraz herbicydowej. Ponadto zapowiedzi „Zielonego Ładu” wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań ochrony roślin.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom stworzyliśmy hybrydową ochronę roślin opartą o „Bio-preparaty” i twardą chemię. Tak skomponowana technologia daje pewność ochrony oraz spełnia wstępne założenia „Zielonego Ładu”. Nowa gama produktów jest już dostępna w naszej ofercie a o jej zaletach można przeczytać w niniejszym katalogu.

Proponowane rozwiązania to aktualna wiedza oraz poszerzanie doświadczeń w produkcji roślinnej.

Błażej Serkowski
Dyrektor Zarządzający

SPIS TREŚCI:

HERBICYDY

ZBOŻA..... 3

OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ

– TECHNOLOGIA..... 3

HEXYPYR 200 EC..... 4

BAZOKA 750 WG..... 4

SUNDA..... 5

USŁUGI AGROCHEST..... 5

KUKURYDZA..... 6

OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY

– TECHNOLOGIA..... 6

CHWASTY UCIAŹLIWE W KUKURYDZY..... 6

INNOVATE 240 SC..... 7

NOTOS 100 SC..... 7

DICASH..... 8

TECHNOLOGIA NAWOŻENIA

Z LINIĄ NAWOZÓW PLUS..... 8

APLIKACJA AGROCHEST..... 9

BURAK CUKROWY..... 10

OCHRONA HERBICYDOWA

BURAKA CUKROWEGO – TECHNOLOGIA..... 10

CHWASTY UCIAŹLIWE W BURAKACH
CUKROWYCH..... 10

OCHRONA FUNGICYDOWA

BURAKA CUKROWEGO – TECHNOLOGIA..... 11

METAFOL PRO..... 12

OBLIX 500 SC..... 12

VENZAR 500 SC..... 13

BEETUP FLO..... 13

SHIRO..... 13

HELION 300 SL..... 14

BAGIRA 040 EC..... 14

FUNGICYDY

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ

– TECHNOLOGIA..... 16

CHOROBY GRZYBOWE ZBÓŻ..... 17

FOLIA DO SIANOKISZONKI..... 17

KROTON..... 18

FLEXITY 300 SC..... 18

MYRESA PRO..... 19

IMBEX XE..... 19

FOSSA 633 EC..... 20

SOLIGOR 425 EC..... 20

BAGANI 125 ME..... 21

PABLO 250 SC..... 21

PREPARATY BIOLOGICZNE

BAKTIPLANT..... 22

HEPTAPLANT..... 22

BONANZA..... 23

STABILIZATOR AZOTU

LIMUS® CLEAR..... 23

RZEPAK..... 24

OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAKU

– TECHNOLOGIA..... 24

CHOROBY GRZYBOWE RZEPAKU..... 24

OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAKU

– TECHNOLOGIA..... 25

SZKODNIKI..... 25

FUNGICYDY

MAGNELLO 350 EC..... 26

AMISTAR GOLD MAX..... 26

AMON 450 EC..... 26

ARGUS 250 EC..... 27

INSEKTYCYDY

DECIS MEGA 50 EW..... 27

GLOBE..... 28

KESTREL 200 SL..... 28

REGULATORY WZROSTU

STIFF NT 250 EC..... 29

ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL..... 29

BIOSTYMULATORY

AGRO AMINO..... 30

C-WEED 50 R..... 30

ADIUWANT DOGLEBOWY

GRAND PLUS..... 31

KONDYCJONER WODY

AQUA PLUS..... 33

SURFUKTANT

KOMPAN PLUS..... 33

ŚRODEK DO MYCIA OPRYSKIWACZY

CLEAR PLUS..... 34

PLUSY Z AGROCHESTEM..... 35



HERBICYDY


OCHRONA HERBICYDOWA ZBOŻ

ZBOŻA OZIME I JARE CHWASTY DWULIŚCIENNE

Bazoka 750 WG: 15 g/ha
+
fluroksypyr 200 EC: 0,5 l/ha
+
Kompan Plus: 0,15 l/ha

ZBOŻA OZIME MIOTŁA ZBOŻOWA I CHWASTY DWULIŚCIENNE

Sunda: 0,8 l/ha
+
Bazoka 750 WG: 15 g/ha
+
Hexypyr 200 EC: 0,5 l/ha
+
Kompan Plus: 0,15 l/ha



CHWASTY UCIAŻLIWE W ZBOŻACH



Gwiazdnica pospolita



Komosa biała



Chaber bławatek



Bodziszek drobny



Mak polny



Przytulia czepna



Maruna bezwonna



Fiołek polny



Tobolek polny



Miotła zbożowa





HEXYPYR 200 EC

synthos
AGRO

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu.

Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5–10 dniach.

Chwasty wrażliwe – chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe – fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime – termin stosowania: wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH32).

DAWKA

0,6 – 1,0 l/ha.



BAZOKA 750 WG

jebagro
A DIVISION OF JENSEN & JENSEN

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

tribenuron metylu (związek z grupy sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie. W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych, co prowadzi do inhibicji biosyntezy białek. Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity, jasnota purpurowa.

Chwasty średnio wrażliwe – jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna.

Chwasty średnio odporne – fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime – wiosną, od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20–39).

DAWKA

20,0 g/ha.





SUNDA

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,6%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie emulsji (olej w wodzie EW).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania środka w zależności od warunków atmosferycznych widoczne są po upływie 2–4 tygodni od jego zastosowania. Pierwszym objawem jest zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się zmiany zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czerwienie liści szczególnie na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następu-



Sharda Poland

je od wierzchołków wzrostu. Środek niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe – owies głuchy.

Chwasty średnio wrażliwe – miotła zbożowa.

Chwasty średnio odporne – wiechlina roczna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto: środek stosować wiosną, od początku fazy rozwoju liścia do fazy drugiego kolanka (BBCH 10-32).

DAWKKA

1-1,2 l/ha.

Pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, 1 l/ha.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto 1,2 l/ha.



Usługi Agrochest

tel. 668 613 803

Oferujemy:

- usługę siewu Horsh Pronto DC6
- usługę uprawy i siewu w systemie Strip-till
- usługę zbioru Kombajnem John Deere S680



OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY

OCHRONA
PLUS

Dicash: 0,2 l/ha
+
Notos 100 SC: 0,6 l/ha
+
Innovate 240 SC: 0,2 l/ha
+
Kompan Plus: 0,2 l/ha

Fazy BBCH

0

09

10

11

12

14

15

16

CHWASTY UCIAŻLIWE W KUKURYDZY



Komosa biała



Chaber bławatek



Ostrożeń polny



Chwastnica jednostronna



Bylica pospolita



Szarłat szorstki



Zaślaz pospolity



Psianka czarna



Gwiazdnica pospolita



Rdest powojowy



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



INNOVATE 240 SC

FMC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 240 g/l (23,5%)

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do poschodowego zwalczania jednoliciennych chwastów jednoliciennych i niektórych chwastów dwuliciennych w kukurydzy. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20–25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe – jednoloczne jednolicienne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa; jednoloczne dwulicienne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe – komosa biała.

Chwasty średnio odporne – iglica pospolita, rdest ptasi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zabieg wykonać wcześniej po wschodach w fazie 2–6 liści kukurydzy.

DAWKA

0,2 l/ha.



NOTOS 100 SC

Nufarm

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,4%)

OPIS DZIAŁANIA

Notos 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5–7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe – chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe – przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10–18).

DAWKA

1,5 l/ha.





DICASH

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

dikamba w formie soli dimetyloamonowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 480 g/l (42,09%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wnika do rośliny poprzez korzenie i liście powodując zahamowanie wzrostu, kartowacenie, a następnie zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.



Sharda Poland

Chwasty wrażliwe – komosa biała, ambrozja bylicolistna.

Chwasty średnio wrażliwe – gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne.

Chwasty odporne – fiołek polny, przetacznik perski, tasznik pospolity, maruna nadmorska, chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2–5 liści (BBCH 12–15) i mają nie więcej niż 10–15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2–4 liści.

DAWKA

0,6 l/ha.



Wspomagamy naturę od 1991 roku



**Polskie
Składy
Rolne**

Kompletna Linia Nawozów Plus

Investuj w dobry plon!

NOWOŚĆ!





Darmowa Aplikacja dla Rolników Agrochest APP




NAGRODA ZA INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2021

Gromadź dane o swoich uprawach w jednym miejscu.

**Zarządzaj swoim gospodarstwem
w aplikacji do pobrania w Google Play
i na AppStore:**

- Mapuj swoje pola
- Przechowuj informacje dotyczące gleby, jej klasy, zasobności oraz odczynu
- Prowadź mobilną dokumentację zabiegów agrotechnicznych
- Śledź prognozę pogody oraz okno pogodowe dla oprysków
- Kontroluj zagrożenia ze strony agrofagów
- Bądź na bieżąco z informacjami z branży
- Obliczaj ilość produktów potrzebnych do wykonania zadania
- Przeprowadzaj analizy struktury zasiewów w czasie rzeczywistym



Dołącz do nowej generacji
i sprawdź korzyści, jakie daje
AgrochestApp!

OCHRONA HERBICYDOWA BURAKA CUKROWEGO

ZABIEG I

Shiro: 0,015 kg/ha
+
Aqua Plus: 0,1 l/100 l H₂O
+
Metafol PRO: 1l/ha
+
Oblix 500 SC: 0,4 l/ha
+
Beetup Flo: 1,5 l/ha
+
Kompan Plus: 0,2 l/ha

ZABIEG II

Shiro: 0,015 kg/ha
+
Aqua Plus: 0,1 l/100 l H₂O
+
Metafol PRO: 1,5 l/ha
+
Oblix 500 SC: 0,4 l/ha
+
Beetup Flo: 1,5 l/ha
+
Venzar 500 SC: 0,2 l/ha
+
Kompan Plus: 0,2 l/ha

ZABIEG III

Shiro: 0,015 kg/ha
+
Aqua Plus: 0,1 l/100 l H₂O
+
Metafol PRO: 1,5 l/ha
+
Oblix 500 SC: 0,4 l/ha
+
Beetup Flo: 1,5 l/ha
+
Venzar 500 SC: 0,3 l/ha
+
Kompan Plus: 0,2 l/ha

Helion 300 SL: 0,25–0,3 l/ha

Fazy BBCH

0

05

10

12

14

16

33

CHWASTY UCIAŹLIWE W BURAKACH CUKROWYCH



Komosa biała



Rdest ptasi



Ostrożeń polny



Rumian polny



Szarłat szorstki



Przytulia czepna



Chaber bławatek



Gwiazdnica pospolita



Samosiewy rzepaku



Chwastnica
jednostronna



Maruna
bezwonna



OCHRONA FUNGICYDOWA I NAWOŻENIE DOLISTNE BURAKA CUKROWEGO



BBCH

19

31


33

39



DOLISTNY NAWÓZ KRZEMOWO-WAPNIOWY

- ... Zwiększa polaryzację i plon buraka cukrowego
- ... Regeneruje rośliny po stresie herbicydowym
- ... Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki
- ... Zwiększa odporność roślin na suszę





METAFOL PRO



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,09%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednoliciennych chwastów dwuliciennych i jednoliciennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liśnienia.

Chwasty wrażliwe – jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe – gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty.

Chwasty odporne – chwastnica jednostronna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)
Zabiegi nalistne: Pierwszy zabieg wykonać w fazie liśnienia chwastów.

DAWKA

1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5–10 dni.



OBLIX 500 SC



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/l (44,1%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd doglebowy lub nalistny do zwalczania chwastów dwuliciennych i częściowego ograniczenia chwastów jednoliciennych w buraku cukrowym i pastewnym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliciennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliciennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Stosowanie przedwschodowe

Chwasty wrażliwe – dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny.

Chwasty średnio wrażliwe – fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna i wilczomlecz obrotowy.

Chwasty odporne – jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny.

Stosowanie powschodowe

Chwasty wrażliwe – maruna bezwonna, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe – fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty i szarłat szorstki.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny

Środek ochrony roślin Oblix 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Stosowanie przedwschodowe: zaleca się wykonać zabieg środkiem Oblix 500 SC przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zabieg przedwschodowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem na cały okres wegetacji i konieczne jest wykonanie zabiegów powschodowych.

Zastosowanie przedwschodowe (przed lub tuż po siewie) wyklucza stosowanie środka Oblix 500 SC powschodowo w mieszaninach.

Stosowanie powschodowe: maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dwóch zabiegów): 1 l/ha.





VENZAR 500 SC



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

lenacyl (związek z grupy uracyli) – 500 g/l (44,25%).

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd stosowany nalistnie do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

VENZAR 500 SC pobierany jest przez korzenie chwastów, które wkrótce po wschodach zamierają.

Chwasty wrażliwe – fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała,

przetacznik perski, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

STOSOWANIE ŚRODKA

Venzar 500 SC stosuje się po wschodach roślin buraka w dawkach dzielonych:

- pierwszy zabieg przeciwko chwastom w fazie liścieni,
- drugi zabieg w momencie wschodów chwastów, około 7–10 dni po pierwszym zabiegu.

DAWKA

0,5 l/ha.



BEETUP FLO



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

fenmedifam (substancja z grupy pochodnych fenylkarbaminianów) 160 g/l (15,95%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do poschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2–4 liści.

Chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, żóltlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe – fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty odporne – chwastnica jednostronna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)

Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraków w fazie 2–4 liści buraka (BBCH 12–14). Maksymalna / zalecana dawka całkowita stosowana w sezonie wegetacyjnym: 6,0 l/ha.

Środek najlepiej stosować w dawkach dzielonych, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. **Pierwszy zabieg:** maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Odstęp między zabiegami: 6–10 dni. **Drugi zabieg:** maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Odstęp między zabiegami: 6–10 dni. **Trzeci zabieg:** maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Lub Pierwszy zabieg: maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Odstęp między zabiegami: 6–10 dni. **Drugi zabieg:** maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.



SHIRO



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

triflusalufuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 500 g/kg

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy acetylmleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, co prowadzi do zahamowania wielu procesów życiowych, w tym głównie do zahamowania podziału komórek w tkankach merystematycznych powodując inhibicję wzrostu pędów i korzeni, a tym samym wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Środek pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Objawy działania takie jak

przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłódów środek działa wolniej. Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe – fiołek polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe – rdestówka powojowata.

Chwasty średnio odporne – gwiazdnica pospolita.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy – środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 10–39). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: 7–14 dni

DAWKA

30 g/ha.



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



HELION 300 SL



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

chlorypyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g/l (25,8%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd przeznaczony jest do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego, a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym i buraku cukrowym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

HELION 300 SL pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe – chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy – środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.

Pszenica ozima – środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy.

Burak cukrowy – środek stosować w fazie rozkwitu liści (od 2 do 4 liści).

DAWKA

0,3 l/ha.



BAGIRA 040 EC



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

chizalofof-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 40 g/l (4,38%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wschodach) w uprawach roślin rolniczych i warzywnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd selektywny o działaniu układowym pobierany bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 6–10 dni od wykonania zabiegu. Pełny efekt widoczny jest po 14–20 dniach.

Chwasty wrażliwe – chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, perz właściwy.

Chwasty odporne – rośliny dwuliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej, dawkę dostosować do gatunku zwalczanego chwastu.

DAWKA

0,8–1,5 l/ha.



BASF

We create chemistry

Kroton® + Flexity® 300 SC

Dostrzeż nową jakość
wczesnowiosennej ochrony!

Myresa® Pro + Imbrex® XE

Ochrona spod szczęśliwej gwiazdy

- Szeroki zakres zwalczanych patogenów zbożowych
- Wyjątkowo silne działanie dzięki zawartości Revysol
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

Dystrybutor




Wspomagamy naturę od 1991 roku



Polskie
Składy
Rolne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



DOŁĄCZ DO
REVYLUCJI


stosuj fungicydy
zawierające

Revysol®




FUNGICYDY

OCHRONA STANDARD



OCHRONA PLUS





CHOROBY GRZYBOWE W ZBOŻACH




Rdza brunatna



Rdza brunatna widziana pod mikroskopem



Septorioza paskowa liści pszenicy



Septorioza paskowa liści pszenicy widziana pod mikroskopem



Łamliwość podstawy



Łamliwość podstawy widziana pod mikroskopem




Mączniak prawdziwy zbóż



Mączniak prawdziwy zbóż widziana pod mikroskopem



Rynchosporioza zbóż



Rynchosporioza zbóż widziana pod mikroskopem



Wspomagamy naturę od 1991 roku

W ofercie Agrochest posiadamy wysokiej jakości folię do sianokiszonki

- posiada 7 warstw
- filtr UV

Do wyboru rolki
o szerokości: 500 i 750 mm
Producent: Folpol





KROTON®

BASF
We create chemistry

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 160 g/l (16,3%)
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 300 g/l (30,5%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima – łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

Pszenica ozima, pszenica jara – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).

Jęczmień ozimy, jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż.

DAWKA

0,75 l/ha.



FLEXITY® 300 SC

BASF
We create chemistry

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenyłowego) – 300 g/l (25,51%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w postaci stężonej zawiesiny o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość podstawy źdźbła i traw.

Pszenżyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość podstawy źdźbła i traw.

Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.

DAWKA

Szczegółowe informacje odnośnie terminów stosowania, liczby zabiegów oraz zalecanej ilości wody w etykiecie środka. Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25–0,5 l/ha.

Kroton® + Flexity® 300 SC

Działanie systemiczne trzech substancji czynnych

Metrafenon jest skuteczny przeciwko wielu stadiom rozwojowym zwalczanych patogenów



Kielkowanie



Infekcja



Wzrost strząpek infekcyjnych



Zarodnikowanie

Mączniak prawdziwy

Łamliwość podstawy źdźbła

	Kielkowanie	Infekcja	Wzrost strząpek infekcyjnych	Zarodnikowanie
Mączniak prawdziwy				
Łamliwość podstawy źdźbła				



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



MYRESA® PRO

BASF
We create chemistry

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

mefentriflukonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,07%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż.

Pszenżyto ozime – septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż.

Jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.

Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.

DAWKA

1,5 l/ha.



IMBREX® XE

BASF
We create chemistry

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

fluksapyroksad (związek z grupy karboksamidów) – 62,5 g/l (6,33%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), tamiwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania). Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wy-

stąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Jęczmień jary – plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).


Pszenżyto ozime – rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Żyto ozime – rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

DAWKA

2,0 l/ha.

Myresa® Pro + Imbrex® XE – Revysol® przeciwko szerokiemu spektrum chorób





FOSSA 633 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 333 g/l (31,7%)

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 300 g/l (28,6%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd o działaniu powierzchniowym, wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszemica ozima – septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30–39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40–59).



Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

DAWKA

1,5 l/ha.



SOLIGOR 425 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 53 g/l (5,4%)

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 224 g/l (22,9%)

tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 148 g/l (15,1%)

OPIS DZIAŁANIA

Soligor 425 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszemica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów.

Pszemica jara – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszemżyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszemżyto jare mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.



Jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Żyto – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, fuzarioza kłosów.

DAWKA

0,7–1 l/ha.





BAGANI 125 ME



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

tetrakonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,57%)

OPIS DZIAŁANIA

Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści. Termin stosowania środka: od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40–69).

DAWKI

1 l/ha

Burak cukrowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka. Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

DAWKI

0,8 l/ha.



PABLO 250 SC



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%).

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara – mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów.

Żyto – rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Rzepak ozimy – czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza.

Fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy.

Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń.

Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń.

Marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy.

Pomidor w uprawie polowej – zaraza ziemniaka, alternarioza.

Por – rdza pora, alternarioza pora.

Seler – septorioza selera.

Papryka w uprawie tunelowej – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

DAWKI

0,8 – 1,0 l/ha.

Szczegółowe informacje odnośnie terminów stosowania, liczby zabiegów oraz zalecanej ilości wody dostępne w etykiecie środka.





PREPARATY BIOLOGICZNE



BAKTIPLANT



OPIS DZIAŁANIA

BaktiPlant to preparat, który wzmacnia aktywność metaboliczną roślin i działa zapobiegawczo. Zawiera w swoim składzie kompozycję opartą na mikroorganizmach, które poprzez wydzielenie metabolitów mogą na drodze konkurencji eliminować drobnoustroje chorobotwórcze lub znacznie ograniczać rozwój fitopagenów.

BaktiPlant nadaje uprawom następujące właściwości:

- zwiększa aktywność fizjologiczną,
- stymuluje wzrost wegetatywny roślin,
- indukuje produkcję enzymów litycznych ograniczających rozwój fitopagenów,
- aktywuje system obronny roślin,
- wytwarza siderofory.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Uprawy rolnicze – zboża: pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, jęczmień, owies, pszenżyto, żyto. Rzepak, kukurydza, burak cukrowy i ziemniak.

DAWKI

0,5–0,8 l/ha.

Zalecany wydatek cieczy: 150–300 l/ha.

Można stosować łącznie z fungicydami za wyjątkiem środków miedziowych i siarkowych.

Uprawy warzywne – ogórek w uprawie polowej i pod osłonami, pomidor w uprawie polowej i pod osłonami, papryka uprawiana w gruncie i pod osłonami, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe.

DAWKI

0,5–0,8 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5–10 dni.

Uprawy sadownicze – jabłoni, wiśni, czereśni: 0,4 l na każde 100 l wody.

Owoce miękkie (truskawka, malina) i pozostałe uprawy: 0,5–0,8 l/ha.

Inne zastosowania

Fertygacja: 1–3 l/ha.



HEPTAPLANT



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

miedź skompleksowana kwasem heptaglukonowym 7% m/m

miedź (Cu) całkowita, rozpuszczalna w wodzie 7% m/m

OPIS DZIAŁANIA

HeptaPlant jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, pełniącym funkcje odżywcze, poprawiającym zdrowotność rośliny, utrudniającym porażenie przez patogeny.

Czynnikiem kompleksującym jest kwas heptaglukonowy, który penetrując kutikulę zwiększa pobieranie miedzi przez komórki roślinne, powoduje jej translokowanie po całej roślinie (w górę i w dół). Indukuje syntezę fitoaleksyn, głównie terpenoidów.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

DAWKI

1–3 l/ha.

Dawka rekomendowana: 1 l/ha.

Maksymalna dawka dla 1 razowego zastosowania: 3 l/ha.





BONANZA



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

Preparat Bonanza nie jest chemicznym środkiem ochrony. Stosowanie preparatu jest metodą alternatywną (fizyczną) w stosunku do metod chemicznych ochrony roślin przed szkodnikami.

OPIS DZIAŁANIA

Preparat tworzący lepką powłokę, która unieruchamia i uśmierca organizmy szkodliwe. Zapewnia:

- szybkie działanie w szerokim zakresie temperatur,
- brak pozostałości substancji aktywnych stosowanych w konwencjonalnych środkach ochrony roślin,
- brak problemu uodporniania się szkodników,
- szerokie spektrum zwalczanych szkodników,
- zwiększenie skuteczności tradycyjnych środków ochrony roślin,
- możliwość kilkukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Preparat wykazuje działanie interwencyjne, ze względu na działanie fizyczne nie powoduje selekcji ras odpornych na działanie preparatu oraz nie posiada okresu karencji.

Uprawy rolnicze – zalecane stężenie: 0,15–0,2% (150–200 ml preparatu w 100 l wody), zalecana ilość wody – 200 l/ha.

Uprawy sadownicze – zalecane stężenie: 0,1–0,2% (100–200 ml preparatu w 100 l wody).

Uprawy warzywne – zalecane stężenie: 0,05%–0,2% w zależności od uprawy.

Rośliny ozdobne – zalecane stężenie: 0,05%–0,1% (50 ml – 100 ml preparatu w 100 l wody).

STABILIZATOR AZOTU

LIMUS® CLEAR



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

NBPT (triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego) – 18,75 %

NPPT (triamid kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego) – 6,25 %

OPIS DZIAŁANIA

Preparat Limus® Clear jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do płynnych nawozów azotowych zwiększa efektywność nawożenia azotowego. Zastosowanie preparatu obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej transformacji mocznika w amoniak i dwutlenek węgla redukując ich emisję do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej a wielkość plonowania oraz jego jakość ulegają poprawie.

- zwiększa dostępność azotu w krytycznych fazach rozwoju roślin, co przekłada się na wzrost plonowania,
- pozwala na większą elastyczność w aplikacji nawozów, niezależnie od pogody,
- ogranicza negatywne oddziaływanie nawozów na bazie mocznika na środowisko.


STOSOWANIE ŚRODKA

Zalecane dawki

- 0,9 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 28% N roztworu saletrzano-mocznikowego,
- 1,0 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 30% N roztworu saletrzano-mocznikowego,
- 1,1 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 32% N roztworu saletrzano-mocznikowego.



OCHRONA FUNGICYDOWA PLUS



Ograniczenie
ilości
pestycydów
-30% chemii

CHOROBY GRZYBOWE W RZEPAKU



Sucha zgnilizna kapustnych
(Phoma)



Sucha zgnilizna kapustnych
widziana pod mikroskopem



Zgnilizna twardzikowa



Zgnilizna twardzikowa
(fuszyny)



Czerń krzyżowych



Czerń krzyżowych (fuszyny)




Szara pleśń




Szara pleśń (fuszyny)



OCHRONA INSEKTYCYDOWA PLUS



SZKODNIKI



Pchełka rzepakowa
osobnik dorosły



Pchełka rzepakowa
larwa



Pryszczarek kapustnik



Ślodyszek rzepakowy



Śmietka kapuścianka
osobnik dorosły



Śmietka kapuścianka
larwa



Chowacz brukwiacek



Chowacz czterożębny





FUNGICYDY



MAGNELLO 350 EC

syngenta®

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

difenokonazol – 100 g/l (9,9%) (związek z grupy triazoli)

tebukonazol – 250 g/l (24,8%) (związek z grupy triazoli)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd o działaniu grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczonym do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy sarepskiej i gorczycy białej przed chorobami grzybowymi, jak również w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy – sucha zgnilizna kapustnych:

- **Jesień** – termin stosowania: od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH

14–18). Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

- **Wiosna** – termin stosowania: od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

W sezonie wegetacyjnym wykonać maksymalnie 2 zabiegi – po jednym jesienią i wiosną.

DAWKA

0,8 l/ha.



AMISTAR GOLD MAX

syngenta®

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 125 g/l (11,4%)

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

- **Sucha zgnilizna kapustnych** – środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby:
 - jesienią – od fazy 4 liści rzepaku do końca wegetacji jesiennej (BBCH 14–29),
 - wiosną – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do

fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31–55).

- **Zgnilizna twardzikowa** – środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61–69).

DAWKA

1 l/ha

Burak cukrowy – chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści.

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście (90% powierzchni gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39–49).

DAWKA

1 l/ha.



AMON 450 EC

Pestila.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 450 g/l (42,5%)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszemica ozima

- **Łamliwość źdźbła zbóż** – środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
- **Septorioza paskowana liści pszenicy** – środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).

Żyto ozime

- **Łamliwość źdźbła zbóż** – środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

- **Plamistość siatkowa jęczmienia** – środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51). Środek może wykazać średni poziom zwalczania choroby.

Rzepak ozimy

- **Czerń krzyżowych** – środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od fazy zwartego kwiatostanu (zielony pąk) do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyń na rzepaku (BBCH 51–70).

DAWKA

1 l/ha.



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



ARGUS 250 EC



Sharda Poland

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%)

OPIS DZIAŁANIA

Argus 250 EC jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, malin, jeżyn, pietruszki, marchwi, buraka pastewnego i roślin ozdobnych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Parch jabłoni – od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

Mączniak jabłoni – od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

DAWKA

0,4 l/ha.



INSEKTYCYDY



DECIS MEGA 50 EW



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80%)

OPIS DZIAŁANIA

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy – **mszyca burakowa**: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydłone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, **DAWKA** 0,1–0,2 l/ha, **pchełka burakowa**, **drobnica burakowa**: stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2–4 liści buraka), **DAWKA** 0,1–0,2 l/ha, **śmietka ćwikłanka**: stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2–4 liści buraka), **DAWKA** 0,2 l/ha.

Pszemka ozima, **jęczmień jary** – **mszyce**: stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu młecznego dojrzałości ziarna, **DAWKA** 0,1–0,125 l/ha, **skrzypionki**: stosować od początku wylęgania się larw, **DAWKA** 0,1–0,125 l/ha.

Ziemniak – **larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej**: zabieg wyko-

nać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej, **DAWKA** 0,1–0,15 l/ha

Rzepak ozimy – **gnataz rzepakowiec**: stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią), **DAWKA** 0,15 l/ha, **chowacz brukwiacek**: stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, **DAWKA** 0,15 l/ha.

Rzepak ozimy, **rzepak jary** – **pchełki ziemne**, **pchełka rzepakowa**: stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, **DAWKA** 0,15 l/ha, **ślodyszek rzepakowy**: zabieg przeciwko ślodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębny, stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu, **DAWKA** 0,1 l/ha, **szkodniki łuszczynowe** (**pryszczarek kapustnik**, **chowacz podobnik**): zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, **DAWKA** 0,15 l/ha, **mszyca kapuściana**: stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, **DAWKA** 0,15 l/ha.

Decis mega 50 EW zarejestrowany jest również w uprawach warzywnych sadowniczych i roślinach ozdobnych. Więcej szczegółów znajdziesz w etykiecie.





GLOBE

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

lambda-cyhalotryna (związek z grupy syntetycznych pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

- **Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej** – środek stosować po wystąpieniu szkodnika, **DAWKĄ** 0,075 l/ha.
- **Pchełki rzepakowe** – opryskiwać jesienią po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki ziemne, do początku fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 20), **DAWKĄ** 0,075 l/ha.
- **Ślodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny** – opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu, chrząszczy słodyszka na pąkujących roślinach rzepaku, do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 59), **DAWKĄ** 0,075 l/ha.



KESTREL 200 SL

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (17,6%)

OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

- **Stonka ziemniaczana** (larwy i chrząszcze) – zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12–79), **DAWKĄ** 0,12–0,18 l/ha.

Rzepak ozimy

- **Chowacz brukwiaczek** – stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31–39), **DAWKĄ** 0,15–0,3 l/ha.

CERTIS

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto

- **Mszyce** – zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mleczej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mleczej ziarniaków (BBCH 37–75), **DAWKĄ** 0,075 l/ha.

Kukurydza

- **Omacnica prosowianka** – zabieg najkorzystniej jest wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69), **DAWKĄ** 0,125 l/ha.



- **Chowacz czterozębny** – zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59), **DAWKĄ** 0,15–0,3 l/ha.


- **Ślodyszek rzepakowy** – stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50–60), **DAWKĄ** 0,18–0,3 l/ha.

- **Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik** – zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% tuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71), **DAWKĄ** 0,15–0,3 l/ha.

Jabłoń

- **Owocówka jabłkowieczka** – termin stosowania patrz etykieta, **DAWKĄ** 0,2–0,4 l/ha.
- **Mszyca jabłoniowa** – termin stosowania patrz etykieta, **DAWKĄ** 0,125 l/ha.





REGULATORY WZROSTU



STIFF NT 250 EC



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (22,73%)

OPIS DZIAŁANIA

Regulator wzrostu roślin stosowany w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima – stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego w pełni rozwiniętego (BBCH 30–39).

Jęczmień ozimy – stosować od fazy widocznego liścia flagowego do

fazy liścia flagowego w pełni rozwiniętego (BBCH 37–39).

Pszenżyto ozime – maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Stosować od fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31–32).

Jęczmień jary – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Stosować od początku fazy 1 kolanka do fazy 2 kolanka (BBCH 31–32).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

DAWKA

0,6 l/ha.



ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL



ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 725 g/l (63,8%)

OPIS DZIAŁANIA

Regulator wzrostu i rozwoju roślin stosowany w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa. Hamuje wzrost, skraca i uszczywnia źdźbło zbóż, nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Stosuje się tam, gdzie istnieje ryzyko wylegania zbóż.

Pszenica ozima – zalecana dawka do jednorazowego stosowania: odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha, odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

Środek w dawce 2,1 l/ha można stosować w dawkach dzielonych: I zabieg 1/3 do 2/3 dawki podstawowej, II zabieg w 5–8 dni po pierwszym – pozostała część dawki.

Stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy wyczuwalne pierwsze kolanko w odległości 1 cm od powierzchni gleby.

Wysokość roślin 15–20 cm.

Pszenica jara – zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha. Stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy wyczuwalne jest pierwsze kolanko w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Wysokość roślin 15–20 cm.

Żyto ozime – zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Środek w dawce 2,0 l/ha można stosować w dawkach dzielonych: I zabieg 1/3 do 2/3 dawki podstawowej, II zabieg w 5–8 dni po pierwszym – pozostała część dawki.

Stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy jest ono widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka.

Pszenżyto ozime – zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy jest ono widoczne w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka.

Owies – zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego do fazy czwartego kolanka.





BIOSTYMULATORY



AGRO AMINO



ZAWARTOŚĆ

Naturalny koncentrat aminokwasów pochodzenia zwierzęcego, azot organiczny – 8%, węgiel organiczny – 23,5%, materia organiczna – 47%

OPIS DZIAŁANIA

AGRO AMINO to biostymulator przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych w okresie intensywnego wzrostu roślin i w warunkach stresu.

- przyspiesza regenerację roślin po przebytych stresie,
- stymuluje wzrost wegetatywny roślin,
- zwiększa plon przy łącznym stosowaniu razem z agrochemikaliami oraz mikroelementami, poprawia ich absorpcję.

STOSOWANIE ŚRODKA

Do stosowania nalistnego w uprawach rolniczych, warzywnych i sadach.

DAWKA

1–1,5 l/ha.



C-WEED 50R



ZAWARTOŚĆ

50% koncentrat alg morskich z Oceanu Atlantyckiego uzyskiwanych w technologii zimnej ekstrakcji, 3% mangan (Mn)

OPIS DZIAŁANIA

C-WEED 50 R przyspiesza rozwój roślin i zwiększa ich tolerancję na stres. Koncentrat z alg morskich jest uzyskiwany w technologii zimnej ekstrakcji, dlatego żadne istotne składniki nie ulegają denaturacji w procesach termicznych. Produkt zawiera hormony roślinne naturalnego pochodzenia. Wpływa na:

- wzrost masy korzeniowej,
- wzrost powierzchni zdolnej do fotosyntezy,
- przyspieszony wzrost liści i łodyg,
- intensywniejszą produkcję węglowodanów,
- odporność na choroby i abiotyczne czynniki stresu.

STOSOWANIE ŚRODKA

Do nalistnego stosowania w uprawach rolniczych i warzywnych, zalecany na plantacjach zagrożonych przez czynniki stresowe.

DAWKA

0,5–0,75 l/ha.





ADIUWANT DOGLEBOWY



GRAND PLUS

BIOSTYMA®
Stymulacja upraw

ZAWARTOŚĆ

Wysokiej czystości olej parafinowy, emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu, glikol etylowy, polisorbát w postaci blokowego kopolimeru.

OPIS DZIAŁANIA

Grand Plus powoduje:

- równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni,
- polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na lekko zbryloną glebę,
- szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wyłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Grand Plus przeznaczony jest do łącznego stosowania z produktami agrochemicznymi, w celu ich zatrzymania w wierzchnich warstwach gleby i zapobieżeniu ich ewentualnej degradacji.

Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności pokrycia gleby oraz od trwałości agrochemikaliów zalegających na jej powierzchni.

Zgodność w mieszankach: Grand Plus jest fizycznie kompatybilny z bardzo szeroką gamą agrochemikaliów.

DAWKA

0,2–0,45 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy roboczej.



**Polskie
Składy
Rolne**

Inwestuj w dobry plan

NAWÓZ DOLISTNY

MgS PLUS

Poliole to alkohole cukrowe zawarte w roślinach. Dzięki swoim minimalnym rozmiarom, pierwiastki w formie poliole są najlepiej przyswajalne. Są one 40 razy mniejsze niż cząsteczki EDTA.

Ich wykorzystanie jest rewolucją w rolnictwie.


EFEKTYWNE NAWOŻENIE DZIĘKI TECHNOLOGII POLIOLI



WZMACNIA WIGOR ROŚLINY
ODPORNOŚĆ NA STRES

7 x TAK
LEPSZE WCHŁANIANIE
MIKROSKŁADNIKÓW
WEWNĄTRZ KOMÓRKI ROŚLINNEJ
(przyswajalność)

3 x TAK
SZYBSZY TRANSFER
WEWNĄTRZ ROŚLINY
LIŚĆ - ŁODYGA - KORZEŃ
(mobilność)



MgS PLUS : NAWÓZ WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003
Roztwór siarczanu magnezu (MgSO₄)
Tlenek magnezu (MgO): 6,8 % rozp.w wodzie (85 g/l)
Bezwodnik siarki (SO₃): 13,6 %, rozp.w wodzie (170 g/l)



Zapewniamy wysokie plony

Anwil
GRUPA ORLEN



We provide
high yields



ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
www.anwil.pl
anwil@anwil.pl
nawozy@anwil.pl



KONDYCJONER WODY



AQUA PLUS



Kondycjoner wody używanej do sporządzania cieczy roboczej z pestycydami, szczególnie herbicydami i nawozami dolistnymi.

DAWKA

W zależności od pH wody 75–150 ml/100 l.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

niejonowe surfaktanty, kwasy karbosylowe, indykator pH

OPIS DZIAŁANIA

Aqua Plus poprawia skuteczność stosowanych mieszanin oprysków dolistnych i doglebowych:

- zmniejsza twardość wody,
- obniża pH roztworu,
- zmniejsza napięcie powierzchniowe,
- zapobiega spienianiu cieczy roboczej.



SURFAKTANT



KOMPAN PLUS



ZAWARTOŚĆ

Alkoksylowane alkohole 85%

OPIS DZIAŁANIA

Kompan Plus polepsza właściwości cieczy użytkowej agrochemikałów:


- obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej,
- zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów,
- zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych,
- zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę,
- umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha).

STOSOWANIE ŚRODKA

Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych.

DAWKA

75 ml/100 l wody.



Stosowanie środków ochrony bez surfaktantu Kompan Plus



Po zastosowaniu środka ochrony z surfaktantem Kompan Plus





ŚRODEK DO MYCIA OPRYSKIWACZY



CLEAR PLUS

Środek do mycia i neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opryskiwaczach.

ZAWARTOŚĆ

Związki powierzchniowo czynne, związki neutralizujące i rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony roślin.

OPIS DZIAŁANIA

Clear Plus jest płynnym środkiem do mycia opryskiwaczy, który usuwa pozostałości środków ochrony roślin. Szczególnie polecany do herbicydów sulfonilomocznikowych i glifosatu.

STOSOWANIE ŚRODKA

DAWKA

5 l/1000 l wody.



Jedyny na rynku produkt
przebadany przez IOR



ULTRAHUMUS

to płynny stymulator wzrostu roślin i kondycjoner gleby zawierający koncentrat biologicznie aktywnych kwasów huminowych i fulwowych. Doskonale rozpuszcza się w wodzie i jest łatwy w aplikacji. Aktywnie przemieszcza się w roztworze glebowym, co przekłada się na szybsze i lepsze działanie.

- Poprawia rozkład, mineralizację oraz wykorzystanie składników pokarmowych z resztek pożywnych
- Wpływa na stabilizację zawartości próchnicy w glebie
- Przyspiesza kiełkowanie i rozwój systemu korzeniowego
- Zwiększa efektywność nawożenia
- Sprzyja tworzeniu się struktury gruzełkowej
- Detoksykuje glebę

Humian/fulwian potasu (sól potasowa kwasów huminowych/fulwowych) > 12% (m/m)

kwasów huminowych 80%

kwasów fulwowych 20%

Zawiera szereg makro- i mikroelementów pochodzących ze związków humusowych:
C, N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Zn.

DOŁĄCZ DO NOWEJ
GENERACJI
I SPRAWDŹ KORZYŚCI,
JAKIE DAJE
AGROCHESTAPP!

Plusy z Agrochestem

Zapraszamy do udziału w programie partnerskim

www.agrochestapp.pl

Od 1 stycznia 2022 r. działa nowa edycja programu partnerskiego **Plusy z Agrochestem**.

Możesz zarejestrować się tutaj.

**Zarejestruj się w darmowej aplikacji już teraz.
Zarządzaj swoim gospodarstwem i punktami w jednym miejscu.**

Co zyskasz rejestrując się w nowym miejscu?



JEDEN LOGIN I HASŁO DO ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM I PUNKTAMI W PROGRAMIE
PLUSY Z AGROCHEST




MOŻLIWY WYBÓR SPOSOBU DOSTAWY
POMIĘDZY ODBIÓREM OSOBISTYM
W ODDZIAŁACH AGROCHEST, PRZESYŁKĄ
KURIERSKĄ A PACZKOMATAMI INPOST



CAŁKIEM NOWE ATRAKCYJNE NAGRODY



POWIADOMIENIA SMS O PRZYGOTOWANIU
NAGRODY DO ODBIORU W ODDZIALE



Inwestuj w dobry plan!



Wspieramy naturę od 1991 roku

**AGROCHEST Sp. z o.o.
CENTRALA**

ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
tel. 61 818 88 88
tel. 61 818 86 66
biuro@agrochest.pl

ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 165
64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 00 14
tel. 660 444 731
krzemieniewo@agrochest.pl

COTOŃ

ul. Cotoń 19
88-420 Rogowo
tel. 609 583 246
coton@agrochest.pl

PUNKT GNIEWKOWO

ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
tel. 609 832 629
gniewkowo@agrochest.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 344 03 94
tel. 603 052 157
bydgoszcz@agrochest.pl

PYZDRY

ul. Wrzesińska 10
62-310 Pyzdry
tel. 660 444 733
pyzdry@agrochest.pl

PUNKT ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

ul. Dworcowa 31
88-180 Żłotniki Kujawskie
tel. 660 444 756
zlotniki@agrochest.pl

Edycja styczeń 2022

www.agrochest.pl



/agrochest

