



# N-Bakter

**Wiąże azot  
atmosferyczny  
i udostępnia  
go roślinom**

**Wspomaga aktywność  
metaboliczną rośliny**

**Umożliwia obniżenie  
nawożenia azotowego**

**DAWKA: 0,5l/ha**



**Nawóz specjalny zawierający Paenibacillus durus 10<sup>8</sup>. Przywraca naturalną równowagę gleb. Wiąże azot atmosferyczny i udostępnia go roślinom. Formulacja oparta na mikroorganizmach posiada następujące właściwości:**

- Wiąże azot atmosferyczny i udostępnia go roślinom
- Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny na poz. korzeni
- Umożliwia obniżenie nawożenia azotowego
- Udostępnia azot z atmosfery do roślin
- Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby
- Zwiększa aktywność fizjologiczną
- Stymuluje wzrost vegetatywny
- Wytwarza siderofory
- Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość
- Wspomaga równowagę biologiczną gleby

Pojemność netto **5l**  
Masa netto **5,75 kg**

Produkt wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.18.1259) art. 5.

**STOSOWANIE I DAWKA**

**Uprawy rolnicze** (zboża, rzepak, kukurydza, burak, ziemniak) 0,5 l/ha. Preparat może być stosowany dogłębowo lub nałiśnie w początkowych fazach rozwoju roślin lub na wiosnę po ruszeniu wegetacji w uprawach ozimych. Minimalna temperatura powietrza w trakcie aplikacji 5°C.

**Uprawy sadownicze** - 0,5 l/ha. Wiosną po ruszeniu wegetacji.

**Pozostałe uprawy** 0,5 l/ha – stosować dogłębowo lub nałiśnie w początkowych fazach rozwoju roślin lub na wiosnę po ruszeniu wegetacji. Zabiegi można powtarzać kilka razy w celu uzyskania optymalnej populacji w glebie.

**PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do połowy jego objętości i włączyć mieszadło. Preparat dodawać zawsze jako pierwszy składnik mieszaniny. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy włączonym mieszadło. Powstały roztwór wykorzystać do nawożenia.

**UWAGI**

Przed użyciem i zastosowaniem złożonych mieszanin wykonać test kompatybilności. Preparat można stosować łącznie z herbicydami, fungycydami i insektycydami oraz nawozami dolistnymi. Nie łączyć z preparatami miedziowymi i dezynfekcyjnymi. Powyższe preparaty mogą być stosowane 7 dni przed/po nałiśnej aplikacji preparatu lub 2 dni przed/po dogłębowej aplikacji. Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu opakowania.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin i nawozów dolistnych stosowanych łącznie z preparatem. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. Zanieczyszczenia skóry spowodowane przez preparat przemyć natychmiast bieżącą wodą. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.

**PRZECHOWYWANIE I USUWANIE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych. Całkowicie opróżnione opakowanie usunąć w sposób bezpieczny.

**N-Bakter**



5 904204 984935 >

Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - na opakowaniu  
Nr partii - na opakowaniu

Podmiot wprowadzający:  
SMP Agro Sp. z o.o.  
Komorniki 44, 63-004 Tulice  
tel. +48 61 666 10 16